



Calendrier vaccinal 2022

- BCG
- Diphtérie - tétanos - poliomyélite
- Coqueluche
- Haemophilus influenzae de type b (HIB)
- Hépatite B
- Pneumocoque
- Méningocoque C
- Rougeole - oreillons - rubéole
- Méningocoque B
- Papillomavirus humain (HPV)
- Grippe
- Zona

	1 MOIS	2 MOIS	3 MOIS	4 MOIS	5 MOIS	11 MOIS	12 MOIS	16-18 MOIS	6 ANS	11-13 ANS	14 ANS	25 ANS	45 ANS	65 ANS ET +
BCG	✓													
Diphtérie - tétanos - poliomyélite		✓		✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓ TOUS LES 10 ANS
Coqueluche		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
Haemophilus influenzae de type b (HIB)		✓		✓		✓								
Hépatite B		✓		✓		✓								
Pneumocoque		✓		✓		✓								
Méningocoque C					✓		✓							
Rougeole - oreillons - rubéole							✓	✓						
Méningocoque B			✓		✓		✓							
Papillomavirus humain (HPV)										✓	✓			
Grippe														✓ TOUS LES ANS
Zona														✓

*Hors vaccination contre la covid 19 - Source : Ministère des Solidarités et de la Santé (avril 2022)



Vaccinations obligatoires des nourrissons avant l'âge de 18 mois

Diphtérie - tétanos - poliomyélite

Haemophilus influenzae de type b (HIB)

Coqueluche

Hépatite B

Rougeole - oreillons - rubéole

Pneumocoque

Méningocoque C

Tuberculose (BCG)

La vaccination contre la tuberculose est le plus souvent recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez les enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

Diphtérie - tétanos - poliomyélite (DTP)

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Le rappel de l'adulte contre la coqueluche se fait à 25 ans avec rattrapage possible jusqu'à 39 ans. La vaccination contre la coqueluche de la femme enceinte dès le 2e trimestre de grossesse est recommandée pour protéger son nourrisson.

Haemophilus influenzae de type b (HIB)

Pour les enfants n'ayant pas été vaccinés avant 6 mois, un rattrapage vaccinal peut être effectué jusqu'à l'âge de 5 ans avec le vaccin monovalent (1 à 3 doses selon l'âge).

Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la 1re année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée chez l'enfant et l'adulte à risque.

Méningocoque B

Un rattrapage est possible jusqu'à l'âge de 2 ans pour les nourrissons n'ayant pas reçu les trois doses de vaccins recommandées à 3, 5 et 12 mois.

Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

Rougeole - oreillons - rubéole

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles et les garçons âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes obèses (IMC > 40 kg/m²).

Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

Vaccination COVID

La vaccination est recommandée à tous à partir de 5 ans. Le schéma vaccinal complet comprend le plus souvent 2 injections suivies de rappel(s). Retrouvez le schéma vaccinal actualisé sur : [vaccination-info-service.fr](https://www.vaccination-info-service.fr)

Source : [Vaccination-info-service.fr](https://www.vaccination-info-service.fr)